


岡山和牛子牛飼育マニュアル

◆購買者の求める子牛作り◆

購買者が求める子牛

- 良好な発育の牛
- 肋張りの良い牛
- 骨格・消化器が十分発達した牛
- 余分な脂肪のついていない牛
- 粗飼料を十分食い込んだ牛
- バラツキがない牛



給与量の目安

| 月 | 齢 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 又キ | ネオ人工乳ペレット | 0.2 | 0.6 | 1.0 | 0.5 | | | | | |
| | 子牛づくり | | | | 1.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 |
| | 良質乾草 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 2.8 | 3.0 |
| | 稲わら | | | | | | | | 0.7 | 1.0 |
| メス | ネオ人工乳ペレット | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | | | | | |
| | 子牛づくり | | | | 0.9 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 |
| | 良質乾草 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 2.8 | 3.0 |
| | 稲わら | | | | | | | | 0.7 | 1.0 |

(給与目安)

給与上の注意

1. 子牛の発育に応じ、飼料を給与しましょう。
2. 飼料の切り替えは、1~2週間を目途に切り替えて下さい。
3. 子牛の便の状況を見て給与して下さい。
4. 稲わらは制限給与、良質乾草は不断給与が基本です。
5. 残飼は必ず毎日取り除き、新鮮な飼料を給与して下さい。
6. 新鮮な水を自由に飲めるようにして下さい。
7. 子牛への給与は、母牛と飼槽を分け、母牛に子牛飼料を食べられないようにして下さい。
8. 飼料計算については、ネオ人工乳ペレット・子牛づくり・チモシー乾草の数値を適用。

家畜個体管理システムの耳標装着を！

●月齢別飼育のポイント

| | 分娩前 | 分娩 | 1ヵ月 | 2ヵ月 | 3ヵ月 | 4ヵ月 | 5ヵ月 | 6ヵ月 | 7~8ヵ月 |
|------|------------------------|--|-----|-----------------------------|--------------|--------------|-----|--------------|--------------|
| 日常管理 | ★増飼(母牛)(2ヶ月間) | ★生時体重測定 ★分娩届 ★良質乾草・配合飼料給与(生後7日~) | | ★生産検査申込 発育チェック 良質乾草給与 | ★生産検査 ★去勢 | | | ★出荷申込 ★削蹄 | ★被毛・皮膚・蹄の手入れ |
| 衛生管理 | ★ワクチン接種(大腸菌等) ★牛床清浄 | ★初乳給与 ★へその緒消毒 | | 牛床乾燥 | ★離乳準備 | ★離乳 ★予防接種 | | | |

子牛飼養管理の注意点

1. 飼槽は常に清潔に!
2. 新鮮な水を自由飲水!
3. 疾病は早期発見・早期治療!
4. 良質粗飼料飽食!
5. 日光浴と十分な運動!